BioSentry® 904 Disinfectant is effective in 400 ppm hard water (as $CaCO_3$). Disinfects in 5% organic soil load. Recommended for chicken, turkey, duck, quail, goose, ostrich and other avian hatcheries. Effective in poultry, swine and livestock (including equine) premises. Useful in laboratory animal and animal breeder facilities.

BioSentry® 904 Disinfectant contains sequestering agents, to prevent the precipitation of minerals and metals from hard water.

- deodorizes by killing most microorganisms that cause offensive odours.
- contains no perfume to mask or hide any odours that might exist.

BROAD SPECTRUM GERMICIDAL ACTION IN HARD WATER AND UNDER SOIL LOAD CONDITIONS: At four (4) mL per liter (1:250) in official A.O.A.C. Use-Dilution and Fungicidal Tests, BioSentry® 904 Disinfectant is effective in water up to 400 ppm hardness (as $CaCO_3$) and an organic soil load of 5% serum, against the following organisms:

BACTERIA

Alcaligenes faecalis	ATCC 8748
Bordetella avium	ATCC 35086
Enterobacter aerogenes	ATCC 13699
Enterococcus faecium (Streptococcus faecalis)	ATCC 6569
Escherichia coli	ATCC 11229
Klebsiella pneumoniae	ATCC 4352
Pasteurella multocida	ATCC 7707
Proteus mirabilis	ATCC 25933
Proteus morganii	ATCC 25830
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 15442
Salmonella choleraesuis	ATCC 10708
Salmonella enteritidis	ATCC 4931
Salmonella gallinarum	ATCC 9184
Salmonella pullorum	ATCC 9120
Salmonella typhosa	ATCC 6539
Serratia marcescens	ATCC 264
Shigella dysenteriae	ATCC 13313
Shigella sonnei	ATCC 29930
Staphylococcus aureus	ATCC 6538
Streptococcus agalactiae	ATCC 27916
Streptococcus pyogenes	ATCC 9547

FUNGI

Aspergillus fumigatus	ATCC 10894
Candida albicans	ATCC 18804
Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale	ATCC 9533

VIRUSES/MYCOPLASMA: Using accepted virus propagation and hard surface test methods, BioSentry® 904 Disinfectant is effective at 1:250 in 400 ppm hard water and 5% serum against the following viruses and mycoplasma:

Birnavirus	ATCC VR-478
Canine parvovirus canin	ATCC VR-953
Coronavirus	ATCC VR-22
Coronavirus	ATCC VR-763
Herpesvirus	ATCC VR-135
Herpesvirus	ATCC VR-783
Mycoplasma gallisepticum	ATCC 15302
Mycoplasma iners	ATCC 19705
Parainfluenza	ATCC VR-281
Paramyxovirus	ATCC VR-109

PRECAUTIONS:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

DANGER: IRRITANT TO EYES. DO NOT GET IN EYES, ON SKIN OR ON CLOTHING. HARMFUL IF SWALLOWED. AVOID CONTAMINATION OF FOOD. WHEN HANDLING THE CONCENTRATE, OR WHEN THERE IS POTENTIAL FOR EYE CONTACT, WEAR GOGGLES. IF THE BUILDING OR ROOM MUST BE ENTERED, THEN THE INDIVIDUALS ENTERING THE BUILDING OR ROOM MUST WEAR A SELF-CONTAINED RESPIRATOR APPROVED BY NIOSH / MSHA. GOGGLES, LONG SHIRT SLEEVES AND PANTS. FOR GOOD HYGIENE PRACTICES, WEAR CHEMICAL RESISTANT GLOVES WHEN USING THIS PRODUCT.

Do not spray or apply this product unless the workers are wearing a face mask with spray mist eliminating cartridges. Do not use BioSentry® 904 Disinfectant on feeders or waterers and do not allow contact with food, feed or drinking water. BioSentry® 904 Disinfectant should not be mixed with other cleaning or disinfecting compounds. Do not use BioSentry® 904 Disinfectant on vaccination needles, equipment or diluent bottles as the residual germicide may render vaccines ineffective.

FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. For contact with eyes, call a physician. Remove and wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, promptly drink a large quantity of milk, egg whites, gelatin solution, or if these are not available, drink large quantities of water. Avoid alcohol. Call a physician immediately. Take container, label or product name with you when you seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, respiratory depression, and convulsions may be needed. Refer to MSDS sheet.

DISPOSAL:

(1) Rinse the emptied container thoroughly and add the rinsings to the treatment site.
(2) Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its disposal or reconditioning.
(3) Make the empty container unsuitable for further use.
(4) Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
(5) For information on the disposal of unused, unwanted product and the clean up of spills, contact the Provincial Regulatory Agency.

DIRECTIONS FOR USE

BioSentry® 904 Disinfectant is a complete, chemically balanced disinfectant that provides clear use solutions even in cold water. Kills a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria, fungi and viruses associated with the avian hatching industry, poultry, swine and livestock (including equine) premises, laboratory animal facilities and kennels. (See antimicrobial efficacy chart on the container label.)

DIRECTIONS FOR USE IN AVIAN HATCHERIES: For disinfecting precleaned surfaces: Use BioSentry® 904 Disinfectant to disinfect precleaned non-porous surfaces including hatchers, setters, trays, racks, egg flats, walls, floors, ceilings and other surfaces in the hatchery environment. It is also excellent for chick boxes, egg cases, vans and trash containers.

Preclean the surface to be disinfected with a BioSentry® hatchery cleaner. Rinse and if possible let surfaces dry. Then, apply BioSentry® 904 Disinfectant at four (4) mL per litre of water (0.40%) by immersion, by flowing solution over treated surfaces, by use of a soft coarse spray, with a clean mop or cloth, or through a foaming apparatus. Thoroughly wet surfaces. Surfaces should remain moist for 10 minutes for complete disinfection.

NOTE: *Do not spray BioSentry® 904 Disinfectant solutions unless workers are protected from breathing the spray mist.*

SANITIZING HATCHERY ROOMS BY FOG APPLICATION: Close room off so fog is confined to the room to be treated. Mix one (1) part BioSentry® 904 Disinfectant to five (5) parts water. Insert the nozzle of the fogger through a suitable opening into the room. With the setting on maximum output, fog for one (1) to three (3) minutes for each 113 cubic meters of space in the room (4000 ft³). Duration of fogging time is dependent on type of fogging equipment used. Refer to fogger instructions. Under no circumstances should a room or building be entered by anyone within 4 hours or until fog has completely settled.

NOTE: *The fog generated is very irritating to the eyes, skin and mucous membranes. Under no circumstances should a room or building be entered by anyone until the fog has completely settled, normally 1 – 4 hours after the actual fogging. If feeders and waterers are not removed from the premises during treatment, or were not adequately covered to prevent contact with treatment, they should be washed with detergent and water before use for poultry or livestock.*

SANITIZING INCUBATORS AND HATCHERS BY FOGGING: Prepare a stock solution of 45 mL BioSentry® 904 Disinfectant to 1 litre of water. Fog 90 – 240 mL of this solution into setters and hatchers immediately after transfer. Repeat daily in setters and every 12 hours in hatchers. Discontinue hatcher treatments approximately 24 hours prior to pulling the hatch. Do not allow people to contact or breathe this fog and do not enter machines until the fog has settled (30 – 60 minutes after fogging is completed). To do this, install permanent fogging nozzles in setters and hatchers and use an air compressor to disperse the sanitizing solution as a fog. Contact your BioSentry® Technical Representative if you need assistance.

It is also satisfactory to fog setters and hatchers with 4 mL of BioSentry® 904 Disinfectant per litre of water. If this is done, fog for 30 – 90 seconds once per hour or once every two hours. Contact your BioSentry® Technical Representative for assistance.

DISINFECTING CHICK VANS, EGG TRUCKS, HATCHERY AND FARM VEHICLES: Clean and rinse vehicles and disinfect with 4 mL per litre of BioSentry® 904 Disinfectant. Rinse after 10 minutes contact. BioSentry® 904 Disinfectant should not be mixed with other cleaning or disinfecting compounds or products.

DIRECTIONS FOR USE ON POULTRY, SWINE AND LIVESTOCK (INCLUDING EQUINE) FARMS

GENERAL FARM DISINFECTANT USES: (4 mL per litre, 1:250)

(a) Remove all livestock and feeds from premises, trucks, coops or crates to be treated.
(b) Remove all litter, bedding and manure from floors, walls and surfaces of facilities traversed or occupied by animals.
(c) Empty all feeding devices and watering appliances.
(d) Clean all surfaces with water or water and a compatible detergent.
(e) Saturate all surfaces with BioSentry® 904 Disinfectant diluted at 4 mL per litre of water using a brush, cloth, mop or mechanical spraying device. Small items (forks, shovels, scrapers) may be immersed. Treated surfaces must remain moist for at least 10 minutes for proper germicidal action.
(f) Ventilate buildings, trucks, coops and other closed spaces. Do not house livestock or use equipment until treatment has thoroughly dried.
(g) Thoroughly scrub all feeding and watering equipment with detergent and rinse with potable water before reuse.

VEAL, CALVING, HOG, CATTLE AND HORSE OPERATIONS: Between depopulations of facilities, cleaning and disinfection of pens, hutches, aisles, ventilation equipment, utensils and other environmental surfaces may be required. Flush soils from these areas and clean and disinfect with 4 mL of BioSentry® 904 Disinfectant per litre of water. Take care to avoid disinfectant use solution contact with animals, feed, feed equipment, water or watering devices as indicated above. If spray contacts feeders or waterers, scrub them and rinse well with potable water before they are reused.

BOOT BATH: Use 8 mL of BioSentry® 904 Disinfectant per litre of water (1:125) in boot baths. Change solution daily and anytime it becomes visibly soiled. Use a nylon bristled brush to clean soils from boots.

SANITIZING POULTRY HOUSES AND LIVESTOCK BUILDINGS USING BIOSENTRY® 904 DISINFECTANT VIA THERMAL FOGGING: After the building has been depopulated and cleaned as in (a) (b) (c) and (d) under «General Farm Disinfectant Uses», double check to be sure all people, poultry, livestock and pets have vacated the building. Close all windows, doors, louvers, curtains, etc., making the building as closed and tight as possible. Mix one (1) part BioSentry® 904 Disinfectant with two (2) parts water in the reservoir of the fogger. With the setting on maximum output, fog the treatment into the room or building to be sanitized. Use a total of one litre of BioSentry® 904 Disinfectant for each 186 square meters of floor space. If the area is more than 8 meters high, use two (2) litres per 186 square meters of floor space. In multi-story buildings, the application must be repeated for each floor that is to be sanitized. The fogger itself may be placed just inside the door of the building to be treated, or the nozzle of the fogger may be inserted through a suitable opening in the door or building. The opening should be just large enough to accommodate the nozzle. After fogging, the building should be kept closed for twenty-four hours. After twenty-four hours the fog should have settled and the

building can then be opened and aired. The building should be opened for a minimum of twenty-four hours before it is repopulated with poultry or livestock.

NOTE: *The fog generated is very irritating to the eyes, skin and mucous membranes. Under no circumstances should a room or building be entered by anyone within 4 hours or until the fog has completely settled. If the building or room must be entered before the fog completely settles, then individuals entering the building or room must wear a self-contained respirator approved be NIOSH/MSHA, goggles, long shirt sleeves and pants. If feeders and waterers were not removed from the premises during treatment, or were not adequately covered to prevent contact with treatment, they should be washed with detergent and water before use for poultry and livestock.*

DIRECTIONS FOR USE IN ANIMAL CARE FACILITIES, ANIMAL RESEARCH CENTERS, ANIMAL BREEDING FACILITIES, KENNELS AND ANIMAL QUARANTINE AREAS: BioSentry® 904 Disinfectant is a one-step germicide, fungicide, soapless cleaner and deodorant effective in the presence of organic soil (5% serum). It is non-selective and, when used as directed, will not harm tile, terrazzo, resilient flooring, concrete, painted surfaces, varnished wood, glass or metals.

- To clean and disinfect hard surfaces, use 4 mL of BioSentry® 904 Disinfectant per litre of water (1:250). Apply by immersion, flushing solution over treated surfaces or with a mop, sponge, cloth or bowl mop to thoroughly wet surfaces. Prepare fresh solutions daily or when solution becomes visible dirty.
- To clean badly soiled areas, use up to 12 mL per litre of water (1:83).
- To disinfect, allow treated surfaces to stand for at least 10 minutes before wiping or rinsing.
- To control mould and mildew growth on previously cleaned, hard non-porous surfaces, use 4 mL per litre. Allow to dry without wiping. Reapply as a new growth appears.

See primary container labelling for complete details on precautions and disposal information.

NOTICE TO USER: This product is to be used only in accordance with the directions on the primary container labelling.

BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

APPROVED
By Linda Vienneau at 9:00 am, 4/29/10

Medical 1-800-498-5743
? 1-800-621-8829

BioSentry® MD 904 Disinfectant/Désinfectant

BK 220309-1

Poultry Hatchery, Farm Premises and Animal Care Disinfectant
Désinfectant pour couvoirs, bâtiments de ferme et de soins animaliers

AGRICULTURAL/AGRICOLE

EYE AND SKIN IRRITANT/IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

See inside panel for Precautionary Statements/Lire les mises en garde sur le côté

READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRECAUTION/PRÉCAUTION • DANGER

Manufactured For/ Fabriqué Pour:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956
U.S.A.

Distributed By/ Distribué au Canada Par:
Vétoquinol N.-A. Inc.
2000 ch Georges
Lavaltrie, Quebec
Canada J5T 3S5
1-800-363-1700

Din No. 02319756

EPA Est. No. 10183-MI-01

EPA Est. No. 61282-WI-01

GUARANTEE / GARANTIE :

Didecyl dimethyl ammonium chloride/ Chlorure de didécyldiméthylammonium	9.2%/9,2%
Alkyl(Chlorure d'alkyl (C_{12}-67%, C_{14}-25%, C_{16}-7%, C_{18}-1%) dimethyl benzyl ammonium chloride/diméthyl benzyl ammonium	7.6%/7.6%
Alkyl(Chlorure d'alkyl (C_{12}-40%, C_{14}-50%, C_{16}-10%) dimethyl benzyl ammonium chloride/diméthyl benzyl ammonium	6.2%/6,2%

CORROSIVE/ CORROSIF

POISON

Item #D12709737-CAN

Lot #:

Date of Expiration:

Date D'Expiration:

NET CONTENTS/
CONTENU NET:
5 Gallons/18.93 Litres

BioSentry® 904 Désinfectant est efficace dans de l'eau dure à 400 ppm (en $CaCO_3$). Désinfecte en présence de 5% de saletés organiques. Recommandé pour les couvoirs de poulets, dindes, canards, oies, cailles, autruches et autres types de couvoirs aviaires. Efficace dans les poulaillers, porcheries, étables et écuries. Utile dans les locaux pour animaux de laboratoire et autres bâtiments d'élevage.

BioSentry® 904 Désinfectant contient des agents séquestrants prévenant la précipitation des minéraux et métaux présents dans l'eau dure.

- désodorise en détruisant la plupart des microorganismes causant des odeurs désagréables.
- ne contient aucun parfum pour masquer ou cacher les odeurs existantes.

ACTION GERMICIDE À LARGE SPECTRE DANS L'EAU DURE ET EN PRÉSENCE D'UNE GRANDE QUANTITÉ DE SALETÉS ORGANIQUES: Au tax de 4 ml par litre (1:250), en utilisant la méthode A.O.A.C. Use-dilution and Fungicidal Tests, BioSentry® 904 Désinfectant s'est avéré efficace contre les organismes suivants dans l'eau dure jusqu'à 400 ppm (en $CaCO_3$) en présence de 5% de saletés organiques:

BACTÉRIES

Alcaligenes faecalis	ATCC 8748
Bordetella avium	ATCC 35086
Enterobacter aerogenes	ATCC 63809
Enterococcus faecium (*Streptococcus faecalis*)	ATCC 6569
Escherichia coli	ATCC 11229
Klebsiella pneumoniae	ATCC 4352
Pasteurella multocida	ATCC 7707
Proteus mirabilis	ATCC 25933
Proteus morganii	ATCC 25830
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 15442
Salmonella choleraesuis	ATCC 10708
Salmonella enteritidis	ATCC 4931
Salmonella gallinarum	ATCC 9184
Salmonella pullorum	ATCC 9120
Salmonella typhosa	ATCC 6539
Serratia marcescens	ATCC 264
Shigella dysenteriae	ATCC 13313
Shigella sonnei	ATCC 29930
Staphylococcus aureus	ATCC 6538
Streptococcus agalactiae	ATCC 27916
Streptococcus pyogenes	ATCC 9547

CHAMPIGNONS

Aspergillus fumigatus	ATCC 10894
Candida albicans	ATCC 18804
Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale	ATCC 9533

VIRUS/MYCOPLASME: Dans le cadre de tests reconnus de propagation de virus et de surfaces dures, BioSentry® 904 Désinfectant s'est avéré être un désinfectant efficace à une concentration de 1:250 dans l'eau dure, à 400 ppm et en présence de 5% de saletés organiques, contre les virus et mycoplasmes suivants.

Bimavirus	ATCC VR-478
Canine parvovirus canin	ATCC VR-953
Coronavirus	ATCC VR-22
Coronavirus	ATCC VR-763
Herpesvirus	ATCC VR-135
Herpesvirus	ATCC VR-783
Mycoplasma gallisepticum	ATCC 15302
Mycoplasma iners	ATCC 19705
Parainfluenza	ATCC VR-281
Paramyxovirus	ATCC VR-109

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER: IRRITANT POUR LES YEUX. CE PRODUIT NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU OU LES VÊTEMENTS. NOCIF SI AVALÉ. ÉVITER TOUTE CONTAMINATION DE LA NOURRITURE. LORS DE LA MANIPULATION DU CONCENTRÉ OU S'IL Y A RISQUE DE CONTACT AVEC LES YEUX, PORTER DES LUNETTES PROTECTRICES. S'IL FAUT ENTRER DANS LA PIÈCE OU LE BÂTIMENT, PORTER UN RESPIRATEUR AUTONOME APPROUVÉ PAR NIOSH/MSHA, DES LUNETTES PROTECTRICES, UNE CHEMISE À MANCHES LONGUES ET UN PANTALON, POUR DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE, PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES LORS DE LA MANIPULATION DU PRODUIT.

Ne vaporiser ou appliquer ce produit si les travailleurs portent un masque muni d'une cartouche antibrouillard. Ne pas utiliser BioSentry® 904 Désinfectant dans les mangeoires ou les abreuvoirs et éviter son contact avec la nourriture, la moulée ou l'eau d'abreuvement. BioSentry® 904 Désinfectant ne doit pas être mélangé avec des détergents ou d'autres désinfectants. Ne pas vaporiser BioSentry® 904 Désinfectant sur des aiguilles de vaccination, les instruments ou les flacons servant à la dilution des vaccins. Ce germicide résiduel pourrait inactiver ceux-ci.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'ingestion, boire immédiatement, si disponible, beaucoup de lait, des blancs d'oeufs ou une solution de gélatine; sinon, boire beaucoup d'eau. Éviter l'alcool. Consulter un médecin immédiatement. Emporter le contentant ou l'étiquette ou prendre note du nom du produit lorsqu'on cherche à obtenir des soins médicaux.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Des lésions probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer un lavage gastrique. Il pourrait être nécessaire de prendre des mesures contre un choc circulatoire, une dépression respiratoire ou des convulsions. Consulter la fiche signalétique.

MISE AU REBUT:

(1) Rincer à fond le contenant vide et ajouter l'eau de rinçage au site de traitement.
(2) Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du récipient avant sa mise au rebut.
(3) Rendre le récipient vide impropre à tout usage subséquent.
(4) Mettre le récipient au rebut conformément aux exigences provinciales.
(5) Pour plus de renseignements sur la mise au rebut de toute quantité inutilisée ou superflue et le nettoyage des lieux d'un déversement, communiquer avec le bureau provincial chargé de la Règlementation du produit.

MODE D'EMPLOI

BioSentry® 904 Désinfectant est un désinfectant complet, chimiquement équilibré pour donner une solution claire même dans l'eau froide. Tue un grand spectre de bactéries Gram négatif et Gram positif, de champignons et de virus retrouvés dans l'industrie des couvoir, des bâtiments pour porcs, volailles, bétail (et chevaux) dans les locaux d'animaux de laboratoire et les chenils. (Consulter le tableau d'efficacité antimicrobienne au bas de l'étiquette.)

MODE D'EMPLOI DANS LES COUVOIRS : Pour la désinfection des surfaces prélavées : Utiliser BioSentry® 904 Désinfectant pour désinfecter les surfaces non poreuses prélavées, dont les éclosoirs, incubateurs, tiroirs, supports, alvéoles, murs, planchers, plafonds et autres surfaces du couvoir. Il est aussi efficace pour les boîtes à volailles, les caisses d'oeufs, les véhicules de transport et les contenants à ordures.

Prélaver la surface à désinfecter avec un nettoyant de couvoir BioSentry®. Rincer et, si possible, laisser sécher la surface. Appliquer ensuite par immersion une solution contenant 4 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau (0,40%) en aspergeant la solution sur la surface à traiter à l'aide d'un jet grossier mais doux ou avec une vadrouille propre, un chiffon ou un appareil à mousser. Bien mouiller la surface. Laisser la solution en contact avec la surface pendant au moins 10 minutes pour assurer une désinfection complète.

NOTE : *Ne pas vaporiser la solution BioSentry® 904 Désinfectant sans que les travailleurs soient protégés contre l'inhalation des particules d'aérosol.*

ASSAINISSEMENT DES SALLES DU COUVOIR PAR BRUMISATION : Fermer hermétiquement la pièce de façon à confiner les particules de brumisation. Mélanger une (1) partie de BioSentry® 904 Désinfectant dans 5 parties d'eau. Insérer la buse du brumisateur dans une ouverture appropriée de la pièce à traiter. Après avoir réglé l'appareil à un débit maximal, brumiser pendant

une (1) à trois (3) minutes pour chaque 113 mètres cubes d'espace (4000 pi^3). Consulter le mode d'emploi du brumisateur pour connaître la durée idéale de la brumisation qui dépend du type d'équipement utilisé. Personne ne doit, en aucun cas, pénétrer dans une pièce ou un bâtiment traité pendant 4 heures suivant la brumisation ou jusqu'à ce que celle-ci se soit complètement dissipée.

NOTE : *La brumisation générée par l'appareil est très irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses. On ne doit laisser en aucun cas pénétrer quelqu'un dans une salle ou un bâtiment traité(e) avant que la brumisation se soit complètement dissipée, habituellement entre 1 et 4 heures après le traitement. Si les mangeoires et les abreuvoirs des bâtiments n'ont pas été retirés avant le traitement ou n'ont pas été adéquatement recouverts pour éviter le contact avec le traitement, il faut les laver au détergent et à l'eau avant leur utilisation.*

ASSAINISSEMENT DES INCUBATEURS PAR BRUMISATION : Préparer une solution-mère de 45 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau. Pulvériser de 90 à 240 ml de cette solution dans les incubateurs et les éclosoirs immédiatement après le transfert. Répéter quotidiennement dans les incubateurs et aux 12 heures dans les éclosoirs. Arrêter le traitement des éclosoirs environ 24 heures avant de sortir la couvée. Ne laisser personne entrer dans les machines avant que la brumisation se soit déposée (de 30 à 60 minutes après la fin de la pulvérisation). Pour ce faire, installer des buses permanentes dans les incubateurs et les éclosoirs et utiliser un compresseur d'air pour disperser la solution sous forme de brumisation. Pour obtenir de l'aide, communiquer avec le représentant technique de BioSentry®.

Les incubateurs et les éclosoirs peuvent aussi être brumisés efficacement à l'aide d'une solution de 4 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau. Dans ce cas, brumiser de 30 à 90 secondes par heure ou aux deux heures. Pour obtenir de l'aide, communiquer avec le représentant technique de BioSentry®.

DÉSINFECTION DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE VOLAILLES, DES CHARIOTS POUR OEUFS, DES VÉHICULES DE FERME ET DES COUVOIRS : Nettoyer et rincer les véhicules et les désinfecter avec une solution de 4 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau. Rincer après 10 minutes de contact. BioSentry® 904 Désinfectant ne doit pas être mélangé à d'autres composés ou produits nettoyants ou désinfectants.

MODE D'EMPLOI POUR UTILISATION DANS LES FERMES AVICOLES, PORCINES, BOVINES (ET ÉQUINES)

DÉSINFECTANT D'USAGE GÉNÉRAL : (4 ml par litre d'eau, 1 :250).

(a) Retirer tous les animaux et toute la nourriture des locaux, des camions, cages à poules ou cageots à traiter.
(b) Enlever toute litière et tout fumier des planchers, murs et surface traversées ou occupées par les animaux.
(c) Vider complètement les mangeoires et les abreuvoirs.
(d) Laver toutes les surfaces à l'eau claire ou additionnée d'un détergent compatible.
(e) Saturer toutes les surfaces avec du BioSentry® 904 Désinfectant dilué à 4 ml par litre d'eau en utilisant une brosse, un chiffon, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Les petits articles (fourches, pelles, grattoirs) peuvent être immergés. Pour une action germicide adéquate, les surfaces traitées doivent rester humides pendant au moins 10 minutes.
(f) Après le traitement, ventiler les bâtiments, camions, cages à poules et autres espaces clos. Ne pas réintroduire les animaux ou utiliser l'équipement avant que le traitement soit complètement sec.
(g) Récurer à fond les mangeoires et abreuvoirs au détergent et les rincer à l'eau potable avant de les réutiliser.

INSTALLATIONS POUR VEAUX, VÉLAGE, PORCS, BOVINS ET CHEVAUX : Entre chacune des productions, il peut être nécessaire de nettoyer et désinfecter les enclos, les huches, les allées, l'équipement de ventilation, les ustensiles et autres surfaces environnantes. Enlever les saletés de ces pièces et laver et désinfecter celles-ci avec une solution de 4 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau. Éviter tout contact du désinfectant avec les animaux, la nourriture, l'équipement d'alimentation, l'eau et les abreuvoirs tel qu'il est indiqué ci-dessus. Si le produit entre en contact avec les mangeoires ou les abreuvoirs, les laver et les rincer à l'eau potable avant leur utilisation.

BAIN DE BOTTES : Utiliser 8 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre (1 :125) de bain de bottes. Changer la solution chaque jour et chaque fois que la solution devient visiblement souillée. Utiliser une brosse à poils de nylon pour enlever la saleté des bottes.

ASSAINISSEMENT DES POULAILLERS ET DES BÂTIMENTS POUR BÉTAIL À L'AIDE DE BIOSENTRY® 904 DÉSINFECTANT PAR BRUMISATION THERMIQUE : Après avoir vidé le bâtiment de ses animaux et l'avoir nettoyé comme il est indiqué aux étapes (a) (b) (c) et (d) sous « Désinfectant d'usage général », faire une seconde vérification afin de s'assurer que tous (personnes, volailles, bétail, animaux de compagnie) ont été évacués. Fermer toutes les fenêtres, portes, volets, rideaux, etc., afin de rendre le bâtiment le plus hermétique possible. Mélanger une (1) partie de BioSentry® 904 Désinfectant à deux (2) parties d'eau dans le réservoir du brumisateur. À un débit réglé au maximum, pulvériser le traitement dans la pièce ou le bâtiment à assainir. Utiliser en tout 1 litre de BioSentry® 904 Désinfectant par 186 mètres carrés de plancher. Si l'aire est de plus de 8 mètres de hauteur, utiliser 2 litres par 186 mètres carrés de plancher. Pour les bâtiments à plusieurs étages, il faut répéter l'application pour chaque étage. Le brumisateur peut être placé juste à l'intérieur de la pièce à traiter ou sa buse peut être insérée dans une ouverture acceptable dans la porte ou le bâtiment. L'ouverture doit être juste assez grande pour convenir à la buse. Après la brumisation, le bâtiment doit rester fermé pendant 24 heures. Après 24 heures, les particules de brumisation devraient s'être déposées et le bâtiment peut alors être rouvert et aéré. Il faut aérer le bâtiment pendant au moins 24 heures avant l'entrée des volailles ou du bétail.

NOTE : *La brumisation générée par l'appareil est très irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses. On ne doit laisser en aucun cas pénétrer quelqu'un dans une salle ou un bâtiment traité(e) avant que la brumisation ne se soit complètement dissipée, habituellement entre 1 et 4 heures après le traitement. S'il faut entrer dans la pièce ou le bâtiment, porter un respirateur autonome approuvé par NIOSH/MSHA, des lunettes protectrices, une chemise à manches longues et un pantalon. Si les mangeoires et les abreuvoirs des bâtiments n'ont pas été retirés avant le traitement ou n'ont pas été adéquatement recouverts pour éviter le contact avec le traitement, il faut les laver au détergent et à l'eau avant leur utilisation pour le bétail et la volaille.*

MODE D'EMPLOI POUR LES INSTALLATIONS DE SOINS AUX ANIMAUX, CENTRES DE RECHERCHE SUR LES ANIMAUX, INSTALLATIONS DE REPRODUCTION, CHENILS ET AIRES DE QUARANTAINE : BioSentry® 904 Désinfectant est un germicide, fongicide, nettoyant sans savon et désodorisant tout en un, et il est efficace en présence de 5% de saletés organiques. Il est non sélectif et, lorsqu'on l'utilise tel que recommandé, il ne causera aucun dommage aux carreaux de céramique, au terrazzo, aux prélards, au ciment, au bois verni, aux surfaces peintes, au verre ou au métal.

- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures, utiliser 4 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau (1 : 250). Appliquer par immersion en aspergeant la surface à traiter ou en utilisant une vadrouille, une éponge ou un linge en mouillant bien les surfaces. Préparer une solution fraîche chaque jour ou lorsque la solution devient visiblement souillée.
- Pour nettoyer les surfaces très sales, utiliser jusqu'à 12 ml de BioSentry® 904 Désinfectant par litre d'eau (1 : 83).
- Pour une désinfection complète, les surfaces traitées doivent restées humides pendant au moins 10 minutes avant de les essuyer ou les rincer.
- Pour le contrôle des moisissures et de mildiou sur des surfaces dures, non poreuses, préalablement lavées, utiliser 4 ml par litre. Laisser sécher sans essuyer. Réappliquer quand de nouvelles croissances réapparaissent.

Consulter l'étiquette du contenant pour obtenir tous les détails sur les mises en garde et les renseignements relatifs à la mise au rebut.

À L'ATTENTION DE L'USAGER: Ce produit doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.

BioSentry® est une marque déposée de Neogen Corporation.

APPROVED
By Linda Vienneau at 9:00 am, 4/29/10

Médical 1-800-498-5743
? 1-800-621-8829